

第 71 回 3S 会 症例提示

高松利文, 牛丸博泰, 三枝久能, 児玉 亮

南長野医療センター篠ノ井総合病院消化器内科

【症例】 60 歳代女性

【主訴】 嘔吐、下痢

【現病歴】

40 歳代より、肩や腰の疼痛を自覚するようになった。1 年前より大腿部痛が出現した。3 か月前より嘔吐、下痢が続くようになり、当院内科を受診し精査のため入院した。

【内服薬】 リマプロスト 5 μ g 1 日 3 回 毎食後

【嗜好歴】 飲酒歴なし、喫煙歴なし

【現症】 身長 151.4 cm、体重 44.7 kg、BMI 19.5

結膜に貧血・黄染なし、胸腹部に異常なし、下腿浮腫なし

[血算]				[血清]	
WBC	11200 / μ l	T-Bil	0.5 mg/dl	CRP	15.02 mg/dl
RBC	444x10 ⁴ / μ l	Na	133 mEq/l	血清鉄	13 μ g/dl
Hb	10.8 g/dl	K	3.4 mEq/l	UIBC	143 μ g/dl
Ht	34.1 %	Cl	94 mEq/l	鉄飽和率	8 %
Plt	57.9x10 ⁴ / μ l	Ca	8.9 mg/dl	フェリチン	403.1 ng/ml
網赤血球	13.8 ‰	BUN	8 mg/dl	[内分泌]	
[生化学]		Cr	0.46 mg/dl	TSH	0.034 μ IU/ml
AST	10 IU/l	尿酸	2.3 mg/dl	Free T3	2.7 pg/ml
ALT	8 IU/l	血糖	152 mg/dl	Free T4	2.19 ng/dl
LD	151 IU/l	T-CHOL	116 mg/dl		
ALP	313 IU/l	HDL	53 mg/dl		
γ -GTP	36 IU/l	TG	73 mg/dl		
TP	6.4 g/dl	LDL	36 mg/dl		
Alb	2.1 g/d	血中AMY	39 IU/l		

【経過】

AA アミロイドーシスの原疾患である体軸性脊椎関節炎に対して、ステロイドと TNF- α 阻害薬の服用を開始した。

【最終診断】

消化管 AA アミロイドーシス

